

Servei d'Urologia

Circumcisió

En què consisteix aquesta intervenció?

És un procediment quirúrgic que permet eliminar la part de prepuci (pell que cobreix el gland) que impossibilita l'exteriorització del gland.

És habitual que es practiqui en nens tot i que es pot fer a totes les edats, sobretot en els casos en què ocasiona dolor en les relacions sexuals.

La pràctica d'aquesta intervenció garanteix una higiene correcta del gland i prevé infeccions urinàries.

Us ha d'acompanyar algú?

Atès que es tracta d'una intervenció quirúrgica, us aconsellem que us acompanyi una altra persona.

Quina preparació heu de fer?

És molt important que seguiu totes les indicacions que se us donaran a la consulta de l'especialista. En general:

- Només haureu d'estar en dejú si se us practica anestèsia general (ja us informaran) que generalment és en el cas de nens
- Tallar el pèl de la base del penis
- Dutxar –vos el mateix dia de la intervenció
- Portar roba còmode i uns calçotets una mica ajustats



Com es porta a terme la intervenció?

Es tracta d'una intervenció ambulatoria i, per tant, no haureu de quedar ingressats a l'hospital. Haureu d'estar nu de cintura per avall i estirat sobre la taula d'exploracions. La intervenció es porta a terme amb anestèsia local, la durada aproximada és d'uns trenta minuts.

Després de la intervenció us col·locaran un petit apòsit a la punta del penis que no us dificultarà el fet d'orinar.



Què heu de fer després de la intervenció?

- Evitar fer esforços físics les 48 hores següents
- Revisar la ferida a les 24 hores. Ja se us informarà del lloc on heu d'anar
- Us podreu dutxar i és recomanable fer-ho, només heu de tenir cura de mantenir la ferida seca
- Després de dutxar-vos i assecat-vos bé, us haureu d'aplicar un antisèptic que ja se us indicarà. Pot haver-hi un discret sagnat al lloc de la intervenció. En aquest cas només cal que feu una mica de compressió amb una gassa. Si no es controlés caldrà que us ho feu revisar. També pot aparèixer un petit hematoma
- Després de la cura, procureu col·locar el penis cap amunt per evitar la inflamació i poseu-vos els calçotets ajustats
- Els punts de sutura no s'han de retirar, s'aniran desprenent per ells sols al cap d'una setmana o deu dies
- Evitar les relacions sexuals fins que la ferida no estigui totalment cicatritzada
- Si noteu alguna erecció espontània, poseu-vos descalç sobre una superfície freda
- Generalment, les molèsties són mínimes i han de cedir amb els analgèsics que us recomanaran
- Davant de qualsevol dubte, consulteu sempre el vostre professional mèdic de referència

Telèfon i horaris de contacte

93 883 30 01 extensió 1083 - De dilluns a dijous de 8 a 18; divendres de 8 a 15