

Biòpsia de pròstata

En què consisteix aquesta prova?

Consisteix a obtenir petits fragments de la pròstata amb una agulla especial, per tal de poder-ne fer una anàlisi, per mitjà d'un ecògraf i per via rectal.

Us ha d'acompanyar algú?

Per a la realització d'aquesta prova, us aconsellem que us acompanyi una altra persona.

Quina preparació heu de fer?

És molt important que seguiu totes les indicacions, ja que una mala preparació de la zona que s'ha d'estudiar pot dificultar la realització de l'exploració.

MOLT IMPORTANT.

- ✓ No prengueu cap aspirina, ni cap derivat, ni cap altre fàrmac que alteri la coagulació (SINTROM, PLAVIX).
- ✓ La nit abans de la biòpsia haureu d'aplicar-vos una **lavativa** (Ènema Cassen®) i podreu sopar com ho feu normalment.
- ✓ Dues hores abans de la biòpsia, heu d'aplicar-vos una **lavativa** (Clistreran®).
- ✓ Pel que fa a l'alimentació, si la biòpsia es fa amb sedació, cal que vingueu en dejú.
- ✓ Heu de prendre un bany o una dutxa abans de fer la prova.

Com us faran la prova?

És una prova ambulatoria i, per tant, no heu d'ingressar a l'hospital. Us introduiran una sonda ecogràfica per via rectal per poder visualitzar la pròstata. A través de la sonda, s'introdueix una agulla molt fina per poder extreure les mostres i analitzar-les posteriorment.

Durada de la prova

La durada aproximada de la prova és de 20 a 25 minuts.

Què heu de fer el mateix dia i després de l'exploració?

Heu de seguir les recomanacions següents:

1. Fareu quatre dies seguits de tractament amb antibiòtic (Ciprofloxacino® 500 mg).
Important: Començareu a prendre'l el mateix dia de la biòpsia a les 8:00h del matí i anireu prenent un comprimit cada dotze hores tal com indica el gràfic següent:

DIA DE LA BIÒPSIA (1r dia d'antibiòtic)	DIA DESPRÉS DE LA BIÒPSIA (2n dia antibiòtic)	SEGON DIA DESPRÉS DE LA BIÒPSIA (3r dia antibiòtic)	TERCER DIA DESPRÉS DE LA BIÒPSIA (4t dia antibiòtic)
<ul style="list-style-type: none"> • 8:00h matí • 20:00h nit 	<ul style="list-style-type: none"> • 8:00h matí • 20:00h nit 	<ul style="list-style-type: none"> • 8:00h matí • 20:00h nit 	<ul style="list-style-type: none"> • 8:00h matí • 20:00h nit

2. Augmenteu la ingesta de líquids.
3. Podreu seguir la vostra activitat física i la dieta habitual.
4. Després de la biòpsia poden manifestar-se un o diversos símptomes :
 - Febre
 - Sang a les deposicions, sang a l'esperma o sang a l'orina (i a vegades algun coàgul)
 - Malestar o dolor a la zona anal
 - Dificultat d'orinar.

La durada d'aquests símptomes és variable però, en la majoria de casos, desapareixen espontàniament. Si presenteu molèsties lleus, s'aconsella consultar al metge de capçalera.

En el cas de retenció urinària (impossibilitat per orinar), febre o sagnat molt abundant i en augment, seria aconsellable consultar el vostre metge de capçalera o anar al servei d'urgències de l'hospital.

Resultats.

El resultat de la prova el tindreu el dia de la consulta amb l'especialista.