

Servei d'Urologia

Vasectomia

En què consisteix la prova?

És un procediment quirúrgic d'esterilització masculina. Actualment, està considerat el mètode més simple i segur, tot i que sempre existeix la possibilitat d'una fallada.

Consisteix en fer una petita incisió a la part anterior dels testicles i, a través del tall, treure els conductes deferents (els que transporten els espermatozous dels testicles fins al penis) per tallar-los i nuar-los. Fet això, s'introdueixen novament els conductes dins l'escrot. Els testicles segueixen produint espermatozous però, en no trobar via de sortida, aquests moren i són eliminats pel mateix organisme.

La vasectomia no afecta l'activitat sexual de l'home: es continuen tenint ereccions i ejaculacions, l'única diferència és que el semen que s'expulsa no conté espermatozous.

Us ha d'acompanyar algú?

Atès que es tracta d'una intervenció quirúrgica, ús aconsellem que vingueu acompanyats.



Quina preparació heu de fer?

És molt important que seguiu les indicacions que us donaran a la consulta d'Urologia.

La preparació consisteix en:

- Dutxar-vos el mateix dia de la intervenció.
- Tallar el pèl o rasurar-vos l'escrot.
- Portar roba còmoda.
- No cal estar en dejú.
- Haver comentat a l'especialista si teniu alguna al·lèrgia o preneu medicació habitualment
- No cal cap prova complementària, només un anàlisi de sang si no en teniu cap d'anterior.

Com us faran la prova?

Es tracta d'una intervenció ambulatoria, per tant, no haureu de quedar ingressat a l'hospital.

Durant la intervenció estareu nu de cintura en avall i estirat damunt la taula d'operacions.

La intervenció es realitza amb anestèsia local.



Durada de la prova

L'operació sol durar de 30 a 60 minuts.

Què heu de fer després de la prova?

- Durant uns dies després de la intervenció, es recomana portar uns calçotets ajustats o uns suspensoris per alleugerir la sensació de pesadesa.
- En general, les molèsties i el sagnat solen ser mínims.
- Podeu tenir un lleuger dolor i inflamació als testicles, i us pot aparèixer un discret hematoma.
- Excepcionalment, es pot infectar la ferida o aparèixer alguna zona endurida al lloc de la cicatriu.
- A les 24-48 h després de la intervenció se us revisarà la ferida a la consulta de la Infermera d'Urologia, i se us informarà de la conducta a seguir a partir de llavors.
- L'home no és estèril immediatament després de la intervenció, sinó que serà fèril fins que els espermatozous continguts als conductes deferents siguin ejaculats o l'organisme els reabsorbeixi.
- Caldrà que us feu un anàlisi de semen als 6 mesos de la vasectomia, per assegurar l'absència d'espermatozous. Fins que sapiguen el resultat, utilitzeu un altre mètode anticonceptiu.
- Pot ser que l'anàlisi de semen s'hagi de repetir al cap de 3 mesos.
- Seguiu sempre les indicacions específiques que us recomanin.



Resultats

La infermera us notificarà telefònicament el resultat del seminograma.

Telèfon i horari de contacte

93 883 30 01 - Extensions 1228 / 2221. De dilluns a divendres de 8:00 a 15:00 h