

Servei de Pediatria

Atenció ambulatoria

Test de provocació oral

En què consisteix aquesta prova?

Consisteix a valorar la reacció del cos quan ingereix diferents tipus d'aliments, medicaments, conservants i colorants

Us ha d'acompanyar algú?

Depèn de l'edat. És millor que us acompanyi algú.

Quina preparació heu de fer?

Abstenu-vos de prendre tractament antihistamínic set dies abans de la prova.

Com us faran la prova?

El test de provocació alimentari consisteix a donar-vos unes dosis creixents d'aliment. **Els pares han de portar l'aliment.**

El test de provocació de medicaments consisteix a donar el medicament, que li pertocaria al nen, en tres dosis creixents. **Cal portar el xarop.**

A) Quant al test alimentari (fruites, verdures, fruit sec, peix, carn, etc.)

1. Faran una provocació labial que consisteix a passar l'aliment pel llavi del nen i esperaran deu minuts per comprovar si reacciona. Faran un control.
2. Li donaran 1 g d'aliment i esperaran trenta minuts. Després, faran un nou control.
3. N'hi donaran 2 g i repetiran la mateixa maniobra.
4. N'hi donaran 4 g i repetiran el control d'espera.

B) El test de l'ou es farà en dues setmanes consecutives: la primera setmana, li donaran un rovell d'ou dur i, la segona setmana, li donaran truita. Es procedirà a donar l'ou de la mateixa manera que en l'apartat A)

C) El test de la llet de vaca el faran en tres dies consecutius:

- El primer dia li donaran 1cc, 5cc, 10cc de llet en trenta minuts de control i en tres preses.
- El segon dia li donaran 25cc, 50cc de llet en un interval d'una hora entre preses i control.
- El tercer dia li donaran 100cc, 100cc de llet en un interval d'una hora entre preses i control.

D) Quant als medicaments (Ibuprofe, amoxicil·lina, Dalsy, etc.) cal portar el xarop.

S'administrarà, depenent del pes del nen, la dosi terapèutica:

- El mateix dia se li administraran tres dosis del medicament i s'esperarà trenta minuts.

Exemple: de 5 cc de xarop en donaran: 1 cc, 2 cc, 2 cc

E) Quant a l'Aspirina, faran la prova en dos dies consecutius (**no cal dur el medicament**):

- El primer dia li'n donaran 50 mg, 100 mg en un interval d'una hora entre preses i control.
- El segon dia li'n donaran 250 mg, 500 mg en un interval d'una hora i faran un control.

F) Quant el test a conservants i colorants, no cal dur res

Es donaran 2 dosis creixents del producte a testar amb un interval de 1 hora

Què heu de fer després de l'exploració?

Durant les vint-i-quatre hores posteriors a la prova, no podeu prendre ni xocolata ni préssec (per no interferir en els resultats). En acabar la prova, es donarà un full als pares perquè facin un control a casa durant tres dies, i se'ls explicarà com han de fer la introducció de l'aliment i/o medicament.

Telèfon i horaris de contacte

93 883 30 01 extensió 1083 - De dilluns a dijous de 8 a 18; divendres de 8 a 15